

XLI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2017

Blok: Ogrodnictwo

1. Największą produktywność w sterowanej uprawie truskawki osiąga się po zastosowaniu:

- a) sadzonki kopanej
- b) sadzonki zielonej
- c) sadzonki A+
- d) sadzonki wielokoronowej

2. Czarna porzeczka owocuje:

- a) tylko na młodych pędach
- b) na pędach 4-5 letnich
- c) tylko na długopędach
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Triploidane odmiany gruszy charakteryzują się:

- a) owocem z wyraźnym rumieńcem
- b) przemiennością owocowania
- c) pyłkiem o słabej żywotności
- d) owocem o zwiększonej zawartości cukru

4. Jednymi z najlepszych przedplonów pod truskawki są:

- a) gorczyca i zboża
- b) ziemniaki i gorczyca
- c) pomidory gruntowe i zboża
- d) ziemniaki i aksamitka

5. Maliny owocujące na jednorocznych pędach to:

- a) Laszka i Delicja
- b) Polka i Polesie
- c) Polesie i Beskid
- d) Beskid i Radziejowa

6. Skłonnością do partenokarprii cechują się:

- a) grusze
- b) jabłonie
- c) czereśnie
- d) truskawki

7. Ciecie czereśni najlepiej wykonać :

- a) wczesną wiosną
- b) zimą
- c) jesienią
- d) po zbiorach

8. Fosfor w uprawach sadowniczych wnosi się najczęściej:

- a) co roku wczesną wiosną
- b) co roku jesienią
- c) przed posadzeniem sadu
- d) co roku w pełni wegetacji

9. Samopłodna (nie wymagająca zapylacza) odmiana czereśni to:

- a) Vega
- b) Kordia
- c) Lapins
- d) Van

10. Oprysk mocznikiem jesienią ma na celu::

- a) zrzucenie liści
- b) wydłużenie spoczynku
- c) skrócenie spoczynku
- d) większą mrozoodporność

11. Mieszanie powietrza w sadzie chroni pąki przed przymrozkami do temperatury około:

- a) - 8°C
- b) -3,5 °C
- c) -12 °C
- d) - 1,5 °C

12. Okulizację w literę "T" wykonujemy:

- a) tylko wiosną
- b) tylko jesienią
- c) tylko zimą
- d) tylko w połowie lata

13. Podkładkę Gisela 5 stosujemy pod:

- a) czereśnie,
- b) wiśnie,
- c) jabłonie,
- d) grusze

14. Szacowana produkcja jabłek w 2017 roku to ok:

- a) 2mln ton,
- b) 4 mln ton,
- c) 1 mln ton,
- d) 10 mln ton

15. Zaraza ogniowa to choroba:

- a) bakteryjna
- b) wirusowa
- c) grzybowa
- d) mykoplazmatyczna

16. Najefektywniejszym systemem przechowywania owoców ziarnkowych jest:

- a) ULO
- b) kontrolowana atmosfera
- c) chłodnia grawitacyjna
- d) wszystkie powyższe

17. Do owoców pestkowych należą:

- a) jabłka grusze b) grusze i pigwy c) śliwy i wiśnie d) wszystkie poprawne

18. Drosophila suzuki to szkodnik żerujący na:

- a) owocach w sadach b) liściach c) korzeniach d) pędach

19. Śliwa typu węgierka z tolerancją na szarkę to:

- a) Rencłoda Altana b) President c) Tolar d) wszystkie poprawne

20. Wiśnia Łutówka owocuje

- a) na młodych jednorocznych przyrostach
b) na krótkopędach
c) na krótko- i długopędach
d) na wieloletnich długopędach

21. Adjuwant to substancja:

- a) chroniąca przed przymrozkami
b) odstraszaająca gryzonie
c) pozwalająca na lepsze przyleganie oprysków do powierzchni liścia
d) przywabiająca owady zapylające

22. Pomidory "samokończące" stosuje się w uprawach:

- a) polowych
b) amatorskich
c) pod osłonami
d) Wszystkie poprawne

23. Sadzenie marchwi na zagonach wykonuje się w celu:

- a) zapobieganiu rozdzwajaniu się korzeni c) uzyskania krótkich korzeni
b) uzyskania długich prostych korzeni d) uzyskania intensywnej barwy

24. Buraki najlepiej uprawiać :

- a) z siewu
b) z rozsady
c) na zagonach
d) wszystkie poprawne

25. Fasolę Piękny Jaś uprawiamy :

- a) z siewu wiosennego b) z rozsady c) siewu ozimego d) wszystkie poprawne

26. Częścią jadalną brokuła jest :

- a) kwiatostan c) zawiązki liści
b) rozgałęziony pęd d) zawiązki owoców

27. Kolor większości odmian papryki jest związany z:

- a) odmianą c) stadium dojrzewania
b) temperaturą uprawy d) wszystkie poprawne

28. Wczesne ziemniaki sadi się :

- a) koniec kwietnia b) początek kwietnia c) połowa maja d) połowa października

29. Seler naciowy sadi się:

- a) wyłącznie z rozsady
b) wyłącznie z nasion
c) z nasion i z rozsady
d) wszystkie poprawne

30. Ostrość papryki jest zależna od substancji:

- a) Chlorofil b) Karoteny c) Capsajecyna d) Betanina

31. Spośród psiankowatych największe wymagania cieplne ma:

- a) papryka ostra b) papryka słodka c) oierzyna d) pomidor koktajlowy

32. Długość okresu wegetacji rzodkiewki jest zależna od :

- a) warunków świetlnych c) warunków termicznych
b) żyzności gleby d) warunków wodnych

33. Częścią jadalną karczocha jest:

- a) pąk kwiatowy
b) pąki liściowe
c) młode pędy
d) korzenie

34. Pikowania nie tolerują:

- a) pomidor, papryka b) papryka ogórek c) dynia, fasola d) oberżyna, pomidor

35. Optymalna temperatura wzrostu dla brukselki wynosi:

- a) 5-8 °C
b) 3-5 °C
c) 25-30 °C
d) 12-18°C

36. Warzywa najbardziej tolerancyjne na niskie tempetatury to:

- a) nać pietruszki i jarmuż c) jarmuż i burak
b) nać pietruszki i szpinak d) nać pietruszki i marchwi

37. Skorzonera uprawna wymaga gleb:

- a) ciepłych żyznych c) piaszczystych
b) gliniastych d) wymaga wysokiego poziomu wody

38. Patison należy do rodziny

- a) psiankowatych b) dyniowatych c) baldaszkowych d) żadna z wymienionych

39. Cebula szalotka to:

- a) odmiana cebuli c) gatunek cebuli
b) mała cebula d) wszystkie wymienione

40. Odmiana mieszańcowa typu F1 charakteryzuje się :

- a) stabilnymi cechami c) brakiem powtarzalności cech
b) odpornością na mroz d) odpornością na szkodniki

41. Gazania to roślina nadająca się do:

- a) miejsc cienistych c) miejsc półcienistych
b) miejsc słonecznych d) wszystkie poprawne

42. Do roślin pachnących wieczorem należą:

- a) macierzanka
b) konwalia
c) zimowit jesienny
d) przyłaszczki

43. Rabata to:

- a) nasadzenie z roślin jednorocznych c) pojemnik z roślinami kwitnącymi
b) nasadzenie bylinowe d) nasadzenie z dowolnych roślin kwitnących

44. Łąka kwietna to założenie z :

- a) jednorocznych roślin kwitnących c) jednorocznych i wieloletnich roślin kwitnących
b) wieloletnich roślin kwitnących d) wszystkie poprawne

45. Róże herbaciane charakteryzują się :

- a) przyjemnym zapachem c) kolczastymi pędami
b) żółtym kolorem kwiatów d) pędami czepnymi

46. Rośliny cebulowe kwitnące wiosną sadzimy w ogrodzie:

- a) wiosną
b) jesienią
c) wiosną i jesienią
d) wiosną lub jesienią

47. Gerbera należy do roślin o dużych wymaganiach :

- a) wodnych i pokarmowych
b) pokarmowych i świetlnych
c) świetlnych i wodnych
d) wszystkie powyższe

48. Do roślin dwuletnich należą

- a) bratek i niezapominajka
b) mak polny, bratek
c) barwinek, aksamitka
d) stokrotka, aksamitka

